| Author | Country | Sex | Sample_size | ES (95% CI) | % Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | | | | | |
| Lindman, 2017 | Guinea-Bissau | Both | 1104 | 4.10 (2.93, 5.27) | 10.53 |
| Tesfaye, 2016 | Ethiopia | Both | 936 | 5.00 (3.60, 6.40) | 10.48 |
| Phiri, 2017 | Zambia | Both | 148 | 9.10 (4.47, 13.73) | 9.05 |
| Subtotal (I-squared = 56.8%, p = 0.099) | | | | 4.98 (3.39, 6.56) | 30.06 |
| . | | | | | |
| Asia | | | | | |
| Bandopadhyay, 2018 | India | Both | 196 | 7.10 (3.50, 10.70) | 9.62 |
| Bhatia, 2017 | India | Both | 982 | 2.60 (1.60, 3.60) | 10.56 |
| Ramakrishnan, 2013 | India | Both | 256 | 33.60 (27.80, 39.60) | 8.28 |
| Kumar, 2013 | India | Both | 1817 | 15.00 (13.36, 16.64) | 10.42 |
| Win, 2015 | Brunei | Both | 365 | 9.00 (6.06, 11.94) | 9.94 |
| Subtotal (I-squared = 98.4%, p = 0.000) | | | | 13.09 (5.47, 20.70) | 48.82 |
| . | | | | | |
| America | | | | | |
| Gendron, 2019 | Canada | Both | 2685 | 1.30 (0.87, 1.73) | 10.63 |
| Moline, 2016 | USA | Both | 2497 | 14.00 (12.64, 15.36) | 10.49 |
| Subtotal (I-squared = 99.7%, p = 0.000) | | | | 7.63 (-4.81, 20.08) | 21.12 |
| . | | | | | |
| Overall (I-squared = 98.6%, p = 0.000) | | | | 9.58 (5.98, 13.18) | 100.00 |

NOTE: Weights are from random effects analysis