

Utilizzo del Bicarbonato di Sodio nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale in Italia

Caro Collega,

come GdS di Farmacoterapia Neonatale, stiamo conducendo una indagine conoscitiva sull'utilizzo del bicarbonato di sodio in Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) in Italia. La invitiamo a completare questo breve questionario, che abbiamo inviato a tutti i direttori delle UTIN presenti sul territorio nazionale. I dati raccolti verranno trattati in forma anonima e confidenziale. I risultati definitivi verranno presi in considerazione per una eventuale pubblicazione su riviste scientifiche *peer-reviewed*.

Non esiti a contattarci per ulteriori chiarimenti:

email: [redacted] mobile: +39 [redacted]
email: [redacted] mobile: +39 [redacted]

Grazie in anticipo per il tempo e la collaborazione.

GdS Farmacoterapia Neonatale

Può rispondere al questionario online all'indirizzo

<https://goo.gl/forms/nMn3KTyNb6xNOv9K2>

oppure inviare una scansione/foto del questionario compilato via email o mediante Whatsapp ai riferimenti sopra citati

1) La UTIN che Lei dirige annualmente assiste:

- <1000 nati 1000-2000 nati >2000 nati solo neonati outborn

2) Nella UTIN che Lei dirige è pratica comune la correzione dell'acidosi metabolica con NaHCO₃ e.v.?:

- no si

3) Se ha risposto "No" alla domanda n. 2), quali altre strategie terapeutiche vengono impiegate per la correzione dell'acidosi metabolica? (anche più di una risposta):

- modifica dei parametri ventilatori
 miglioramento della perfusione
 boli di volume
 altro (specificare)

4) Se ha risposto "Si" alla domanda n. 2), avete dei valori limite di pH per la correzione con NaHCO₃ ev?

- no
 pH ≤ 7,30 pH ≤ 7,20 pH ≤ 7,10
 altro (specificare)

5) Se ha risposto "Si" alla domanda n. 2), avete dei valori limite di EB per la correzione con NaHCO₃ ev?

- no
 EB ≤ -5 mEq/L EB ≤ -8 mEq/L EB ≤ -10 mEq/L
 altro (specificare)

6) Se ha risposto "Si" alla domanda n. 2), avete dei valori limite di Lattati per la correzione con NaHCO₃ ev?

- no
 Lattati >2mmol/L Lattati >5mmol/L

- altro (specificare)
- 7) Se hai risposto “Si” alla domanda n. 2), che dosaggio di NaHCO₃ utilizzate rispetto alla formula per la correzione del deficit (peso x EB x 0,3)?**
- la dose totale
 metà dose
 un terzo della dose
 1mEq/kg
 altro (specificare)
- 8) Se hai risposto “Si” alla domanda n. 2), cosa utilizzate per la diluizione?**
- acqua distillata
 soluzione fisiologica
 altro (specificare)
- 9) Se hai risposto “Si” alla domanda n. 2), che rapporto utilizzate per la diluizione?**
- 1:1
 1:2
 1:3
 1:4
 altro (specificare)
- 10) Se hai risposto “Si” alla domanda n. 2), che modalità di somministrazione utilizzate?**
- bolo ev (≤ 30 min)
 infusione lenta (30-60 min)
 bolo + infusione lenta
 altro (specificare)
- 11) Nella UTIN che Lei dirige utilizzate il NaHCO₃ solo in alcune particolari patologie?**
- no si
- 12) Se nella UTIN che Lei dirige utilizzate il NaHCO₃ solo in alcune patologie, quali sono? (anche più di una risposta)**
- acidosi tubulare
 patologie con perdita di bicarbonato
 altro (specificare)
- 13) Nei componenti della Nutrizione Parenterale prescritta nella UTIN che lei dirige sono presenti ...**
- acetato
 lattato
 acetato e lattato
 non sono presenti acetato e lattato
 altri sistemi tampone (specificare).....
- 14) Nella UTIN che Lei dirige si sono mai verificate lesione da stravasamento di NaHCO₃?**
- no si

Commenti al questionario

.....
.....
.....
.....